

โรคไข้ฉี่หนู(Leptospirosis)

เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในฉี่ของหนู โค กระบือ สุกร สุนัข ติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย จากทางเดินอาหาร น้ำดื่ม และรอยแผลตามผิวหนัง

*คนติดโรคได้อย่างไร ?

ติดต่อทางตรงและทางอ้อม

การสัมผัส บัสสาวะหรืออุจจาระของสัตว์ติดเชื้อ
เดินลุยน้ำ ลงแช่น้ำ ย่ำดินโคลน ที่มีเชื้อปนเปื้อน

*อาการ

มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและ
โคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาแดง

หากมีไข้ (หลังลุยน้ำ1-2สัปดาห์) ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

*วิธีป้องกันโรคไข้ฉี่หนู

ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเกษตรกร ชาวนา สัตว์แพทย์ชุมชนแออัด

หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือเดินลุยโคลนลุยน้ำ เป็นเวลานาน
ขณะปฏิบัติงานสวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนัง เช่น รองเท้าบูท
รีบทำความสะอาดร่างกายโดยเร็ว หากลงไปแช่น้ำ
รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารที่เหลือเก็บใส่ภาชนะที่มิดชิด

*ยึดหลัก 3 กำจัด

- 1.กำจัดหรือดักหนูด้วยวิธีต่าง
- 2.กำจัดแหล่งอาหารของหนู
- 3.กำจัดที่อยู่อาศัยของหนู



โรคไข้ฉี่หนู

LEPTOSPIROSIS

อันตรายที่มาพร้อมกับฝน

สาเหตุของโรค

โรคนี้พบหรือโรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรียที่อยู่ใน ปัสสาวะของสัตว์พาหะอย่าง หนู สุนัข สุกร มาซึ่งจะปนเปื้อนในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง โดยเขาสัตว์อาจผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล

อาการของโรค



ไข้สูง



ท้อเจ็บ



ตาแดง



ปวดเมื่อย



อาเจียร



ผื่นผิวหนัง

การป้องกันโรค

เมื่อจมน้ำหรือลุยน้ำท่วม ชั่วครู่แล้ว เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์ ให้สวมรองเท้าบูตทุกครั้ง



หากสัมผัสพื้นที่ที่อาจปนเปื้อนไป แล้วให้ล้างทำความสะอาดร่างกาย โดยเร็วและเช็ดให้แห้ง



อย่าให้บาดแผลสัมผัสพื้นที่ที่ปนเปื้อน



รักษาสุขอนามัย เก็บของให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนหรือโรค